

Évaluation du risque carieux

<u>Indicateur du risque</u>	Élevé	Modéré	Faible
• Cliniquement : lésion carieuse <u>active</u> en bouche	Oui		Non
• Radiologiquement : lésion modérée ou sévère; • Au RV de rappel: nouvelle lésion ou progression de lésion	Oui	Lésion initiale suspectée active	Non / lésion initiale suspectée inactive
• Hyposalivation • Radiothérapie T&C, maladie auto-immune, polymédication, âge	Xérostomie sévère	Effets secondaires des médicaments (< 0,5 mL/min)	Salive abondante (>1 mL/min stimulée)
• Restaurations ou extractions pour cause de lésions carieuses • dans les 3 dernières années	3+	1-2	0
• Consommation de collations ou boissons sucrées (prolongée et fréquente)	> 3x/jour entre repas	2x/jour	0-1x/jour, avec les repas
• Appareils amovibles ou traitements orthodontiques		Oui	Non
• Racine exposée / sillons profonds		Oui	Non
• Usage de drogues (tabac, alcool, cannabis, cocaïne, ecstasy, héroïne, méthamphétamines)		Oui	Non
• Perte d'autonomie (maladie physique ou cognitive)		Oui	Non
• Restaurations avec marges défectueuses / contacts ouverts avec fouflage alimentaire / morphologie dentaire qui compromet l'hygiène dentaire		Oui	Non
• Plaque bactérienne		Abondante et collante	Minimale
• Exposition au fluor (eau fluorée, suppléments, application professionnelle, rince-bouche, dentifrice >1 000 ppm F-)		Non	Oui
• Brossage avec dentifrice fluorée 2x/jour, soie dentaire 1x/soir		Non	Oui
• Suivis dentaires réguliers		Non	Oui
<u>Niveau du risque carieux (cocher) :</u>	<input type="checkbox"/> Élevé	<input type="checkbox"/> Modéré	<input type="checkbox"/> Faible